



BURUNDI

LA RIPOSTE AUX PERTURBATIONS DU FINANCEMENT VIH

Ndayizeye Aimé¹, Mpawenayo Willy¹, Gacuti Nadine¹, Karemangingo Saidi¹ Burikukiye Hamza Venant²,

1. Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) 2. Cadre Consultatif et Décisionnel des Organisations des Personnes Vivant avec le VIH/Sida(CCDP+)



CONTEXTE

Le Burundi a maintenu ses progrès vers les objectifs 95-95-95 (99–99–93) malgré d’importantes perturbations. Le licenciement de 137 agents de santé et plus de 300 relais communautaires avec les populations clés a affecté la couverture du traitement antiretroviral (TAR), la suppression virale et les activités de sensibilisation. Les retards dans le système d’information sanitaire, la réduction des services de laboratoire et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont également eu un impact sur la prestation des services. En réponse, des cadres multisectoriels ont été activés et un plan d’action d’urgence mis en place. Au moins 10 millions USD ont été réaffectés pour stabiliser les services essentiels, avec un réalignement progressif basé sur le contexte épidémiologique national et le budget disponible (5 millions USD nationaux, 20 millions USD externes).

STRATÉGIES ADAPTATIVES FACE AUX CONTRAINTES DE RESSOURCES

Avec l’appui du département américain, du Fonds mondial et des ONG locales, le Burundi met en œuvre plusieurs approches pour répondre aux besoins prioritaires:

- 1. **Stratégies financières** : Mise en place d’un fonds nationale pour mobiliser le financement privé du VIH. Organisation pars les ONG de soirées de levée de fonds.
- 2. **Ressources humaines pour la santé (RHS) et renforcement des capacités**: Adoption d’une stratégie de décentralisation et d’intégration des services visant à renforcer les compétences et la disponibilité du personnel de sante au niveau décentralisé.
- 3. **Engagement communautaire** : Implication active des communautés à tous les niveaux du programme (planification, mise en œuvre et le suivi/évaluation malgré les difficultés rencontrées par le community-led monitoring (CLM)).
- 4. **Gestion des données et transfert de compétences**: Le partenaire en gestion des données (DataFi) est désormais intégré au ministère avec l’objectif de transfert des connaissances et des outils de gestion des données.

SERVICES NATIONAUX PRIORITAIRES DE PRÉVENTION, DE DÉPISTAGE ET DE TRAITEMENT

SERVICES DE PRÉVENTION			SERVICES DE DÉPISTAGE			SERVICES DE DÉPISTAGE			SERVICES DE TRAITEMENT			SERVICES DE TRAITEMENT				
Composante	Intervention	BDI	Composante	Intervention	BDI	Composante	Intervention	BDI	Composante	Intervention	BDI	Composante	Intervention	BDI		
Prophylaxie infantile	PEP Nourrison Risque élevé 6-12sem		Produits sanguins	Dépistage des produits sanguins		à l'échelon communautaire (virtuel et en personne)	Pop >15 ans : collecte autotest communautaire		Continuité du TARV	TARV ininterrompu pour tous		Gestion de l'IO	TB Xpert pour les personnes symptomatiques			
	PEP Nourrison Risque élevé 0-6sem			Dépistage symptomatique (entrée)			Pop 95 gap : collecte autotest communautaire			Consultation clinique annuelle			Traitement de la tuberculose			
	PEP pour les nourrissons faible risque			Test premier CPN			Pop clés : collecte autotest communautaire			Inscrire les PSD moins intenses			TPT selon le régime			
PEP	PEP en établissement (selon les directives)		Re-test tardif CPN		Test FA negative (postnatal) tous les 6 mois			Maintien des DSD individuels dans les établissements			CRAG pour les personnes symptomatiques					
	PEP communautaire (VBG/KP)		Test FA negative (postnatal) tous les 6 mois		Sensibilisation virtuelle a l'autotest VIH			Maintien des DSD individuels dans la communauté KP			Traitement de la cryptococcose					
	Préservatifs/lubrifiants en établissement		EEV (Enfant exposé au VIH) 6sem/6-9-18mois en fonction du calendrier PEV		Pop clés : pts sensibilisation fort volume + centres OBC			Maintien des groupes gérés par les clients			LAM S3/4 gravement malade					
Préservatifs	Points de distribution de préservatifs KP		En établissement	Dépistage des EEV a la naissance			Tous les sites de sensibilisation KP			Maintien des groupes d'adolescents (HCW)		CD4 S3/4 Hospitalisation		Paquet MAV	CD4 S3/4 nouveau ou >90j	
	Points de distribution de préservatifs en communauté			Clients atteints de tuberculose (nouvellement diagnostiquée)			Sensibilisation ciblée des ado et jeunes femmes			Maintien de la PSD communautaire-indiv		CD4 S1/2 nouveau ou >90j				
	PrEP en établissement KP 3MMD/ dépistage les 6 mois			Clients atteints de tuberculose (tuberculose présumée)			Sensibilisation ciblée des hommes		Maintien des groupes d'adultes à haut risque		CRAG S1/2 CD4<200					
Continuation de la PrEP	PrEP en établissement FE/FA 3MMD/dépistage tous les 6 mois			les clients atteints d'IST (nouvelles IST)			Dépistage sur le lieu de travail pour les hommes		Fluconazole proph secondaire		Frottis cervico-utérin – jamais dépistée					
	PrEP en établissement autres 3MMD/dépistage tous les 6 mois			Hep B/C (nouveau cas)			Sensibilisation ciblée des enfants		Transfert actif le jour même 3MMD		Dépistage du papillomavirus- jamais effectué					
	Revue clinique annuelle de la PrEP			Patients hospitalisés (nouvelle admission)			Prisonniers : À l'entrée/à la sortie		CTX adultes à haut risque		Intégration de l'hypertension					
	Revue clinique de la PrEP tous les 6m			Enfants dans les cliniques de malnutrition			Prisonniers à l'entrée/annuel		CTX pour VIH/TB		Arterielle					
	PrEP en établissement PSD-indiv			Dépistage a posteriori du PEV chez l'enfant			Sensibilisation ciblée de l'Ado et jeunr hommes		CTX pour PVVH		Intégration du diabète					
	PrEP en dehors de l'établissement PSD			Clients qui commencent la PF					CTX pour enfants exposés au VIH		Intégration du planning familial					
	Renouvellements de PrEP par modèles virtuels			PF <2sans a l' init+annuel					Fluconazole proph secondaire		Dépistage du cancer du col chaque année-FVHIV					
	Conseil en matière d'observance et de réduction du risque			PF init+biennale+changement de partenaire					Initier <5 ans		Confirmation des contacts à chaque visite					
	Poursuite de l'anneau vaginal dapivirine pour PrEP			PF init+annuel					Initier le FE/FA		Suivi téléphonique des résultats de lab anormaux					
	Poursuite des injections longues durées pour prévention VIH			Test de dépistage volontaire du VIH (annuel)					Initiation symptomatique/AHD		Suivi téléphonique des cas à haut risque					
	Initiation (et ré-initiation) à la PrEP	Début PrEP FE/FA s'auto-identifiant vulnérables			CDV/test VIH à n'importe quelle fréquence					Initier tous les positifs		Suivi téléphonique >28 jours manqués				
Début PrEP KP				Utilisateurs de la PrEP 1mois+6mois				Initier le stade 3/4 ou CD4 bas		Suivi à domicile des résultats de laboratoire anormaux						
Début de la PrEP ado /jeunes femmes s'auto-identifiant				Utilisateurs de la PrEP 1mois+3mois				Initier le stade 1/2 (CD4 élevés)		Suivi à domicile des cas à haut risque						
Réduction des risques pour les personnes qui s'injectent des drogues	Aiguilles, seringues stériles et naloxone à collecter en établissement,			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)	Nouveau diag: dépistage partenaires via(NP) + autotest + test en établissement		Test de récence	Test de récence du VIH		Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral	Initier le stade 1/2 (CD4 élevés)		Suivi de la charge virale	VL en cas de suspicion d'échec		
	Aiguilles stériles, seringues et naloxone dans la communauté		Nouveau diag: NP partenaires en établissement /virtuel + autotest			VL en cas de suspicion d'échec			Répéter le test VL à 3 mois			Suivi à domicile des résultats de lab anormaux				
	Poursuivre les renouvellements du traitement de substitution aux opioïdes (TSO) pour usagers de drogues injectables		Nouveau diag: NP partenaires + dépistage en communauté			Premier test VL à 6 mois			Première VL (sans antécédent)			Suivi à domicile des cas à haut risque				
Intitler/continuer le TSO pour usagers de drogues injectables		Femmes nouvellement diag: test enfants blo en établissement ou autotest			Encelinte : VL à la CPN/3mois			Encelinte : VL 34-36w			Suivi à domicile des résultats de lab anormaux					
Augmentation ciblée de la VMCC		Patient ART VL>1000			Encelinte : VL 34-36w			Allaitement : VL 3m+ tous les 6			Suivi à domicile des cas à haut risque					
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)	Nouvelle PF/ANC and<25 ans			Suivi de la charge virale		répétition de la VL à 3 mois		Suivi à domicile des résultats de lab anormaux						
			Nouvelle PF/ANC tout âge :					Virémie faible (VL<1000 c/ml)		Suivi à domicile des résultats de lab anormaux						
			Nouveau cas KP NP +autotest adolescente et jeunes femmes: dépistage en reseaux et autotest					VL annuelle en cas de suppression		Suivi à domicile des résultats de lab anormaux						
	IST pop 95 gap VIH-: NP+ autotest partenaires				VL tous les 2 à 3 ans après deux résultats supprimés				Suivi à domicile des résultats de lab anormaux							
	IST VIH- : notif passive renforcée + autotest partenaires				Test de résistance selon les directives				Suivi à domicile des résultats de lab anormaux							
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)		IST VIH- : notif passive renforcée + autotest partenaires			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale		
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC				En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)				Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC		En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)						Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC			En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)					Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			
VMCC					En réseau (y compris en établissement/virtuel et au niveau de la communauté)			Suivi de la charge virale			Initiation (et ré-initiation) au traitement antirétroviral		Suivi de la charge virale			