

Recommandations de l'OMS – Interventions sanitaires destinées aux populations clés

	Interventions	HSH	TS	PUD	Trans et GD
Essentiel pour l'impact : interventions sanitaires Prévention, diagnostic et traitement	Préservatifs et lubrifiant	✓	✓	✓	✓
	PrEP contre le VIH	✓	✓	✓	✓
	PEP contre le VIH/les IST	✓	✓	✓	✓
	Services de dépistage du VIH	✓	✓	✓	✓
	Traitement du VIH	✓	✓	✓	✓
	Tuberculose associée au VIH : dépistage/diagnostic/traitement/prévention	✓	✓	✓	✓
	Dépistage et traitement des IST	✓	✓	✓	✓
	Services liés à l'hépatite B : dépistage/vaccination/traitement	✓	✓	✓	✓
	Services liés à l'hépatite C : dépistage/traitement	✓	✓	✓	✓
	Prévention de la transmission verticale (VIH, syphilis, VHB)		✓	✓	✓
	Lutte contre le chemsex	✓	✓	✓	✓
	Réduction des risques : programmes d'échange d'aiguilles/seringues	(✓)*	(✓)*	✓	(✓)*
	Réduction des risques : OAMT/méthadone	(✓)*	(✓)*	✓	(✓)*
	Réduction des risques : naloxone pour la prise en charge des surdoses	(✓)*	(✓)*	✓	(✓)*
Essentiel pour la santé au sens large : interventions sanitaires	Services de santé mentale	✓	✓	✓	✓
	Santé anale (IST, cancer lié au HPV)	✓	✓		✓
	Contraception et suivi de grossesse		✓	✓	✓
	Soins liés à l'affirmation de genre				✓
	Cancer du col de l'utérus : prévention/dépistage/traitement		✓	✓	✓
	Consommation dangereuse ou nocive d'alcool et d'autres substances : dépistage et prise en charge	✓	✓	✓	✓
	Tuberculose : prévention/dépistage/diagnostic/traitement			✓	
Soutien : prestation de services	Sensibilisation et accompagnement par les pairs	✓	✓	✓	✓
	Interventions en ligne sécurisées (sensibilisation, gestion de cas et informations de santé ciblées)	✓	✓	✓	✓

(✓)* Il est important d'évaluer les besoins en matière de services de réduction des risques (aiguilles/seringues, traitement de substitution aux opiacés, naloxone pour la prise en charge des surdoses) auprès de toutes les populations clés, y compris les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les travailleurs du sexe (TS), les personnes en milieu carcéral et en milieu fermé, les personnes qui s'injectent des drogues (PID) et les personnes transgenres et de genre divers (Trans & GD)

Tableau : Adapté des Lignes directrices consolidées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH, des hépatites virales et des IST pour les populations clés. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2022. (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240052390>)

Informations clés pour une planification nationale plus large :

- Estimations de la taille de la population
- Données épidémiologiques (par exemple, prévalence et incidence du VIH, prévalence et incidence des hépatites virales)
- Données comportementales (par exemple, consommation de substances, utilisation du préservatif)
- Plan stratégique national
- Capacité du système de santé (par exemple, approvisionnement, ressources humaines de santé)
- Coût des interventions
- Paysage du financement

Recommandations de l'OMS – Fiche de travail pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

	Interventions	Disponibles dans le pays ?	Remarques
Indispensable pour avoir un impact : interventions sanitaires Prévention, diagnostic et traitement	Préservatifs et lubrifiants		
	PrEP contre le VIH		
	PEP contre le VIH/les IST		
	Services de dépistage du VIH		
	Traitement du VIH		
	Tuberculose associée au VIH : dépistage/diagnostic/traitement/prévention		
	Dépistage et traitement des IST		
	Services liés à l'hépatite B : dépistage/vaccination/traitement		
	Services liés à l'hépatite C : dépistage/traitement		
	Évaluer les besoins en matière de services de réduction des risques		
	Lutter contre le chemsex		
Essentiels pour une santé	Services de santé mentale		
	Santé anale (par exemple, IST, cancer lié au HPV)		
	Consommation dangereuse/nocive d'alcool et d'autres substances : dépistage/traitement		
Soutien : prestation de	Sensibilisation et accompagnement par les pairs		
	Interventions en ligne sécurisées (sensibilisation, gestion de cas et informations de santé ciblées)		